



Beslisboom voor inhaalschema's Rijksvaccinatieprogramma 2025


Baby's

Leeftijd nu

Leeftijd 1^e vaccinaties

Vaccinatieschema

Als er al (deel)vaccinaties gegeven zijn, laat je die weg als dat kan.




Kinderen 1 tot 2 jaar

Leeftijd nu

Leeftijd 1^e vaccinaties

Vaccinatieschema



Kinderen 2-18 jaar

Leeftijd nu

Leeftijd 1^e vaccinaties

Vaccinatieschema

Peuter-MenACWY in RVP voor cohort 2019 en jonger: inplannen indien het kind geen MenACWY na 1^e verjaardag heeft gehad.

Peuter-MenACWY voor cohort 2018 en ouder: inplannen indien het kind geen MenACWY of MenC na de 1^e verjaardag heeft gehad.

BMRz: individueel toedienen of tijdens de groepssessie voor de inhaalcohorten. In 2025 zijn dat cohorten 2016 en 2017.

Tiener-MenACWY: indien tieners op of na de 11^e verjaardag een MenACWY hebben gehad, dan ontvangen ze er geen meer vanuit het RVP.

2^e tot 18^e
verjaardag

Geen vaccinaties gehad
of na 2^e verjaardag
begonnen

Voor 1^e verjaardag
begonnen

Tussen 1^e en 2^e
verjaardag begonnen

Schema 4. Start vanaf 2^e tot 18^e verjaardag

1^e vaccinaties : DKTP(-Hib)-HepB1 + BMR1

2^e vaccinaties 2 mnd na 1^e : DKTP(-Hib)-HepB2 + MenACWY

3^e vaccinaties 7 mnd na 2^e : DKTP(-Hib)-HepB3

Hib: hoeft niet na 2^e verjaardag gegeven te worden, maar wordt als onderdeel van Vaxelis toegediend.

Pneu: vervalt na 2^e verjaardag.

BMRz: tussen 2,5 en 3,5 jaar toedienen volgens het reguliere schema. Op oudere leeftijd zo snel mogelijk. Minimaal 1 maand na BMR1 toedienen.

DKT(P)-boosters: minimaal 4 jaar na de laatste DKTP-Hib-HepB3-vaccinatie.

DTP-boosters: minimaal 5 jaar na de DKT(P)-boosters, maar niet eerder dan in het jaar waarin het kind 14 wordt.

HPV en tiener-MenACWY: worden in principe tijdens groeps-vaccinaties toegediend.

Zie schema 1a, 1b of 2 + onderstaande opmerkingen. Als het kind vanaf 3 mnd DKTP(-Hib)-HepB1 heeft gehad, kan nu een 0-2-9 schema worden gevolgd, ook zonder Mat-DKT.

Zie schema 3 + onderstaande opmerkingen.

Opmerkingen

Hib: hoeft niet na 2^e verjaardag gegeven te worden, maar wordt als onderdeel van Vaxelis toegediend.

Pneu: vervalt na 2^e verjaardag.

BMR1: zo snel mogelijk plannen, indien nog niet toegediend.

BMRz: tussen 2,5 en 3,5 jaar toedienen volgens het reguliere schema. Op oudere leeftijd zo snel mogelijk.

Minimaal 1 maand na BMR1 toedienen.

DKT(P)-boosters: minimaal 4 jaar na de laatste DKTP-Hib-HepB3-vaccinatie.

DTP-boosters: minimaal 5 jaar na de DKT(P)-boosters, maar niet eerder dan in het jaar waarin het kind 14 wordt.

HPV en tiener-MenACWY: worden in principe tijdens groeps-vaccinaties toegediend.

Dit is een uitgave van:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

januari 2025

De zorg voor morgen begint vandaag